

Инструкция по применению препарата

Глиформин®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛСР-005803/08 (Глиформин® 0,85 и 1 г)

МНН: Метформин

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Гипогликемическое средство для перорального применения группы бигуанидов.

КОД АТХ: A10BA02

ПОКАЗАНИЯ:

Сахарный диабет 2 типа, особенно у пациентов с ожирением, при неэффективности диетотерапии и физических нагрузок:

- У взрослых в качестве монотерапии или в сочетании с другими пероральными гипогликемическими средствами, или с инсулином;
- У детей с 10 лет в качестве монотерапии или в сочетании с инсулином.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

повышенная чувствительность к метформину или к любому вспомогательному веществу препарата; диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, кома; почечная недостаточность или нарушение функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 60 мл/мин); острые состояния, протекающие с риском развития нарушения функции почек: дегидратация (при диарее, рвоте), тяжелые инфекционные заболевания, шок; клинически выраженные проявления острых или хронических заболеваний, которые могут приводить к развитию тканевой гипоксии (в том числе сердечная или дыхательная недостаточность, острый инфаркт миокарда); обширные хирургические операции и травмы, когда показано проведение инсулинотерапии, печеночная недостаточность, нарушение функции печени; хронический алкоголизм, острое отравление алкоголем; беременность; лактоацидоз (в т.ч. в анамнезе); применение в течение менее 48 часов до и в течение 48 часов после проведения радиоизотопных или рентгенологических исследований с введением йодсодержащего контрастного вещества; соблюдение гипокалорийной диеты (менее 1000 ккал/сут.). Детский возраст до 10 лет.

С осторожностью:

Не рекомендуется применять препарат у лиц старше 60 лет, выполняющих тяжелую физическую работу, что связано с повышенным риском развития у них лактоацидоза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Таблетки следует принимать внутрь, проглатывать целиком, не разжевывая, во время еды или непосредственно после еды, запивая достаточным количеством воды.

Взрослые: монотерапия и комбинированная терапия в сочетании с другими пероральными гипогликемическими средствами:

Обычно начальная доза составляет 500 мг* или 850 мг 2-3 раза в сутки после или во время еды. Возможно дальнейшее постепенное увеличение дозы в зависимости от концентрации глюкозы в крови. Поддерживающая доза препарата обычно составляет 1 500- 2 000 мг в сутки. Для уменьшения побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта суточную дозу следует разделить на 2-3 приема. Максимальная доза составляет 3 000 мг в сутки, разделенная на три приема. Медленное увеличение дозы может способствовать улучшению желудочно-кишечной переносимости. Пациенты, принимающие метформин в дозах 2 000- 3000 мг в сутки, могут быть переведены на прием препарата Глиформин® 1 г. Максимальная рекомендованная доза составляет 3000 мг в сутки, разделенная на 3 приема.

Комбинация с инсулином:

Для достижения лучшего контроля глюкозы в крови метформин и инсулин можно применять в виде комбинированной терапии. Обычно начальная доза препарата Глиформин® составляет 500 мг или 850 мг 2-3 раза в сутки, в то время как дозу инсулина подбирают на основании концентрации глюкозы в крови.

Дети и подростки: у детей с 10 летнего возраста препарат Глиформин® может применяться как в монотерапии, так и в сочетании с инсулином.

Обычно начальная доза составляет 500 мг* или 850 мг в сутки после или во время приема пищи.

Через 10-15 дней дозу необходимо скорректировать на основании концентрации глюкозы в крови.

Максимальная суточная доза составляет 2 000 мг, разделенная на 2-3 приема.

Пациенты пожилого возраста: из-за возможности возможного снижения функции почек дозу препарата Глиформин® необходимо подбирать под регулярным контролем показателей функции почек (определять концентрацию креатинина в сыворотке крови не менее 2-4 раз в год). Длительность лечения определяет врач. Не рекомендуется прерывание приема препарата без указания лечащего врача.

**При назначении врачом начальной дозы 500 мг следует использовать препарат соответствующей дозировки; делить таблетку дозировкой 1 000 мг пополам не разрешается!*

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

имеются побочные действия, ознакомьтесь с Инструкцией по медицинскому применению.

ФОРМА ВЫПУСКА:

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,85 г и 1 г.

По 30 или 60 таблеток в банке полимерную.

Каждую банку с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА:

По рецепту.

**Полная информация по препарату содержится в Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Глиформин®*