

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
Редecil®

Регистрационный номер

Торговое название: Редecil®.

МНН или группировочное название: Ретинол+Диоксометилтетрагидропиримидин&
Лекарственная форма – мазь для наружного применения.

Состав:

Активные вещества: ретинола пальмитат (ретинол)(в пересчете на 100 %) – 0,5 г, метилурацил (диоксометилтетрагидропиримидин) – 3,0 г.

Вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол, воск эмульсионный, вазелиновое масло, глицерин (глицерол), этиловый спирт (этанол) 95 %, вода очищенная до 100 г.

Описание: однородная мазь от белого до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: дерматопротекторное средство.

Код АТХ (D11AX)

Фармакологические свойства

Стимулирует регенерацию кожи, усиливает размножение эпителиальных клеток кожи, тормозит процессы кератинизации, препятствует развитию гиперкератоза. Местное действие обусловлено наличием на поверхности клеток эпителия специфических ретинолсвязывающих рецепторов.

Редecil® легко проникает в кожу, максимальная концентрация действующих веществ в крови достигается через 3-4 часа после нанесения и сохраняется на протяжении 12 часов. Период полувыведения – 5,5 часов.

Показания к применению

Ихтиоз, гиперкератоз, себорейный дерматит, псориаз, пиодермия, атопический дерматит, нейродермит, экзема, обморожения, ожоги, эрозии, язвы, трещины, при атрофии кожи после длительного применения глюкокортикостероидных препаратов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз А, острые воспалительные заболевания кожи.

Беременность и период лактации

Не рекомендуется наносить на обширные участки кожи при беременности (I триместр), кормлении грудью.

Способ применения и дозы

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи утром и вечером в течение 4-12 недель.

Побочные эффекты

Мазь хорошо переносится. В отдельных случаях возможно усиление зуда и покраснение кожи в местах нанесения препарата, что требует временной отмены препарата до снижения остроты процесса. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не применяют в сочетании с другими препаратами, содержащими витамин А и ретиноиды во избежание гипервитаминоза А. Несовместим с антибиотиками тетрациклинового ряда.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения в тубах по 10, 20 и 35 г. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 °С. Замораживания не допускать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Препарат не должен применяться по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускать без рецепта.

Производитель:

ЗАО «Ретиноиды», 111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46 стр.5.
Тел/факс: (495) 684-2187, 234-6118, 234-6119, e-mail: retinoids@yandex.ru
Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

Директор ИДКЭЛС

С.В.Буданов

Представитель ЗАО «Ретиноиды»,
д-р мед. наук

В.И. Альбанова



Handwritten signature of V.I. Albanova