ЛП-№(006384)-(РГ-RU) от 14.08.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.08.2026 № 15798
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Акридерм ГЕНТА, 0,05 % + 0,1 %, мазь для наружного применения

Действующие вещества: бетаметазон + гентамицин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Акридерм ГЕНТА, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм ГЕНТА.

3. Применение препарата Акридерм ГЕНТА.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Акридерм ГЕНТА.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Акридерм ГЕНТА, и для чего его применяют

Препарат Акридерм ГЕНТА содержит гормон бетаметазон (глюкокортикостероид), который оказывает противовоспалительное, противозудное и сосудосуживающее действие, и антибиотик гентамицин, обладающий антибактериальной активностью. Препарат Акридерм ГЕНТА относится к группе препаратов, называемой кортикостероиды, применяемые в дерматологии; кортикостероиды в комбинации с антибиотиками; кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с антибиотиками.

Показания к применению

Препарат Акридерм ГЕНТА применяется у взрослых и детей в возрасте от 2 до 18 лет для лечения:

- простого и аллергического воспаления кожи (дерматит), особенно вторично инфицированного;
- хронического воспаления кожи с зудом, покраснением и высыпаниями (атопическая, детская, монетовидная экземы);
- атопического дерматита (нейродермит диффузный);
- хронического дерматита, вызванного повторяющимися царапинами и/или трением кожи (простой хронический лишай или ограниченный нейродермит);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.08.2026 № 15798
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- солнечного дерматита;
- распространенного покраснения кожи с шелушением и слущиванием кожи (эксфолиативный дерматит);
- радиационного дерматита;
- опрелости;
- хронического воспаления кожи с образованием сухих шелушащихся бляшек, пятен красного или розового цвета (псориаз);
- зуда.

Способ действия препарата Акридерм ГЕНТА

Бетаметазон относится к группе глюкокортикостероидов, которые при нанесении на кожу оказывают противовоспалительное действие и снимают такие явления как зуд, покраснение, шелушение и местную боль. Гентамицин, являясь антибиотиком широкого спектра действия, способствует подавлению вторичной (присоединенной) инфекции.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение после применения препарата, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм ГЕНТА

Противопоказания

Не применяйте препарат Акридерм ГЕНТА:

- если у Вас аллергия на бетаметазон, гентамицин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас туберкулез кожи;
- если у Вас осложнения противооспенной вакцинации (вакциния);
- если у Вас вирусные инфекции кожи;
- если у Вас есть заболевание, характеризующееся покраснением и высыпаниями на коже вокруг рта (периоральный дерматит);
- если у Вас есть высыпания в области щек, обусловленные стойким расширением мелких сосудов (розацеа);
- если у Вас есть кожные проявления сифилиса;
- если у Вас есть кожные поствакцинальные реакции;
- если у Вас есть открытые раны, акне, атрофия кожи, перианальный и генитальный зуд.

Если любое из перечисленных утверждений относится к Вам (или у Вас есть сомнения), обязательно сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Акридерм ГЕНТА проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Акридерм ГЕНТА не рекомендуется применять на коже лица и волосистой части головы.

Использование закрывающих повязок может увеличивать всасывание глюкокортикостероидов, к которым относится бетаметазон, с поверхности кожи и повышать

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.08.2026 № 15798
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

риск развития нежелательных реакций. Если Вы собираетесь использовать подобные повязки, проконсультируйтесь с врачом.

Препарат Акридерм ГЕНТА не предназначен для лечения заболеваний глаз. Избегайте попадания мази в глаза и область вокруг глаз (периорбитальную область).

Необходимо избегать попадания препарата в глаза, поскольку в результате многократного воздействия возможно помутнение хрусталика (катаракты) и развитие глаукомы (заболевания, характеризующегося повышенным внутриглазным давлением).

При применении препарата Акридерм ГЕНТА возможно развитие нарушения зрения. В случае появления нечеткости зрения или других нарушений зрения следует обратиться к врачу.

Препарат Акридерм ГЕНТА не следует использовать для лечения варикозных трофических язв голени и открытых ран.

При длительном применении препарата Акридерм ГЕНТА на больших поверхностях поврежденной кожи возможно всасывание гентамицина, которое может привести к повреждению органа слуха и равновесия (ототоксичности), сопровождающемуся нарушением слуха и появлением шума в ушах. В случае появления симптомов ототоксичности необходимо немедленно прекратить применение препарата Акридерм ГЕНТА и обратиться к врачу.

Некоторые участки тела (паховые складки, подмышечные впадины и перианальная область) в большей степени подвержены риску возникновения растяжек на коже (стрий). Поэтому длительность применения препарата на этих участках тела должна быть ограничена.

В случаях, если на фоне лечения возникла грибковая инфекция, врач может рекомендовать дополнительное применение противогрибкового лекарственного средства.

При длительной терапии препаратом Акридерм ГЕНТА внезапное прекращение терапии может привести к развитию синдрома рикошета, проявляющегося в форме дерматита с интенсивным покраснением кожи и ощущением жжения. Поэтому после длительного курса лечения отмену препарата следует проводить постепенно в соответствии с рекомендациями врача.

Дети

Не применяйте препарат у детей в возрасте до 2 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Дети более восприимчивы к применению местных глюкокортикостероидов, чем пациенты старшего возраста, в связи с повышенной абсорбцией препарата, связанной с большей величиной соотношения у них площади поверхности и массы тела.

Другие препараты и препарат Акридерм ГЕНТА

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Какого-либо взаимодействия препарата Акридерм ГЕНТА с другими лекарственными средствами не зарегистрировано.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Безопасность местного применения глюкокортикостероидов у беременных не установлена; назначение лекарственных препаратов этой группы в период беременности оправдано только

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.08.2026 № 15798
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

в том случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. Во время беременности препараты этой группы не следует применять в высоких дозах или длительное время.

Грудное вскармливание

Если Вы кормите грудью, перед началом применения препарата Акридерм ГЕНТА проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как до настоящего времени не установлено, проникает ли препарат в грудное молоко. Ваш врач посоветует либо прервать грудное вскармливание, либо не применять препарат Акридерм ГЕНТА.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и/или механизмами.

Препарат Акридерм ГЕНТА содержит пропилпарагидроксибензоат (нипазол)

Мазь Акридерм ГЕНТА содержит пропилпарагидроксибензоат (нипазол), который может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

3. Применение препарата Акридерм ГЕНТА

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Мазь следует наносить тонким слоем на пораженный участок кожи и окружающие ткани 2 раза в сутки (утром и вечером), слегка втирая круговыми движениями. На участки с более толстой кожей и места, с которых препарат легко устраняется (ладони и ступни), мазь следует наносить чаще.

Применение у детей и подростков

Режим дозирования для детей в возрасте от 2 до 18 лет соответствует режиму дозирования для взрослых. Эффективность и безопасность препарата Акридерм ГЕНТА у детей в возрасте от 0 до 2 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Детям препарат назначают только по строгим показаниям и под врачебным контролем, так как возможно развитие системных побочных эффектов, связанных с бетаметазоном и гентамицином. При применении препарата у детей необходимо ограничивать общую продолжительность лечения и исключать мероприятия, ведущие к усилению всасывания (согревающие, фиксирующие и закрывающие повязки, подгузники). Непрерывный курс лечения у детей не должен превышать 5 дней.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения зависит от эффективности и переносимости терапии и составляет, как правило, не более 2–4 недель.

Если у Вас есть вопросы о том, как долго применять препарат Акридерм ГЕНТА, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если Вы применили препарата Акридерм ГЕНТА больше, чем следовало

При длительном применении местных глюкокортикостероидов в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.08.2026 № 15798
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

недостаточности и симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко-Кушинга, проявляющийся появлением лунообразного лица, центрального ожирения (отложения жира в области лица, шеи, груди, спины и живота), уменьшением плотности костей, повышением артериального давления, развитием отеков и изъязвления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, повышением уровня сахара в крови (гипергликемия), появлением стрий на коже живота и бедер.

При однократной передозировке гентамицина появления каких-либо симптомов не ожидается. Длительное лечение гентамицином в повышенных дозах может привести к росту нечувствительной флоры.

Немедленно обратитесь к врачу, если:

– Вы использовали большее количество мази Акридерм ГЕНТА, чем необходимо;

– Вы или Ваш ребенок случайно приняли внутрь этот лекарственный препарат.

В подобных ситуациях Вам или Вашим близким может потребоваться медицинская помощь.

Если Вы забыли применить препарат Акридерм ГЕНТА

Если Вы забыли использовать мазь в нужное время, используйте ее, как только вспомните. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу препарата.

Если Вы прекратили применение препарата Акридерм ГЕНТА

Если Вы хотите завершить лечение препаратом, обратитесь к лечащему врачу.

При длительном лечении глюкокортикостероидами внезапное прекращение терапии может привести к развитию синдрома рикошета, проявляющегося в форме дерматита с интенсивным покраснением кожи и ощущением жжения. Поэтому после длительного курса лечения отмену препарата следует проводить постепенно.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Акридерм ГЕНТА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Ваш лечащий врач обсудит это с Вами и расскажет о возможных рисках и пользе лечения.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Акридерм ГЕНТА:

- чувство жжения;
- покраснение кожи (эритема);
- мокнутие (экссудация);
- нарушение пигментации кожи;
- зуд.

При применении глюкокортикостероидов местного действия, особенно при использовании окклюзионных (закрывающих) повязок, наблюдались следующие нежелательные реакции:

- чувство жжения, зуд, сухость кожи;
- воспаление волосяных фолликулов (фолликулит);
- избыточный рост волос (гипертрихоз);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.08.2026 № 15798
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- угри;
- появление светлых пятен на коже (гипопигментация);
- периоральный дерматит;
- аллергический контактный дерматит;
- размягчение и отечность (мацерация) кожи;
- развитие вторичной инфекции;
- истончение (атрофия) кожи;
- стрии;
- потница.

В случаях значительного попадания гентамицина в кровь существует опасность повреждения слухового нерва и вестибулярного аппарата, сопровождающегося шумом в ушах и нарушением слуха. Такие побочные явления развиваются в тех случаях, когда пациенты одновременно принимают токсичные для слухового аппарата и почек препараты, и при нарушении функции почек.

При продолжительном лечении или нанесении на большую поверхность возможно развитие системных побочных эффектов глюкокортикостероидов:

- повышение массы тела;
- снижение плотности костей (остеопороз);
- повышение артериального давления;
- отеки;
- изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта;
- обострение скрытых очагов инфекции;
- повышенный уровень сахара (глюкозы) в крови (гипергликемия);
- возбуждение;
- бессонница;
- нарушения менструального цикла;
- нечеткость зрения.

Дополнительные нежелательные реакции у детей

При продолжительном лечении или нанесении на большую поверхность возможно развитие системных побочных эффектов глюкокортикостероидов:

- подавление функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы;
- синдром Иценко-Кушинга;
- задержка роста;
- отставание в прибавке массы тела;
- повышение внутричерепного давления.

Если у Вас или Вашего ребенка появились перечисленные выше симптомы, обратитесь к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.08.2026 № 15798
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Акридерм ГЕНТА

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре от 15 до 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Акридерм ГЕНТА содержит

Действующими веществами являются бетаметазон и гентамицин.

Каждые 100 г мази содержат 0,05 г бетаметазона (бетаметазона дипропионата микронизированного) (в пересчете на 100 % вещество – 0,064 г) и 0,1 г гентамицина сульфата в пересчете на гентамицин.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: пропилпарагидроксибензоат (нипазол), парафин жидкий (вазелиновое масло), изопропилпальмитат, вазелин.

Препарат Акридерм ГЕНТА содержит пропилпарагидроксибензоат (нипазол) (см. раздел 2).

Внешний вид Акридерм ГЕНТА и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Полупрозрачная мазь белого или почти белого цвета.

По 15 или 30 г в тубу алюминиевую. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.08.2026 № 15798
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.
Телефон: +7 (495) 702-95-03
Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.
Телефон: +7 (495) 702-95-03
Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.