ЛП-№(002838)-(РГ-RU) от 13.10.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Ацикловир-Акрихин, 200 мг, таблетки

Ацикловир-Акрихин, 400 мг, таблетки

Действующее вещество: ацикловир

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Ацикловир-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Ацикловир-Акрихин.

3. Прием препарата Ацикловир-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Ацикловир-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Ацикловир-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит действующее вещество ацикловир, относящееся к группе противовирусных средств системного действия; противовирусных средств прямого действия; нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы.

Показания к применению

Препарат Ацикловир-Акрихин применяется у взрослых и детей в возрасте от 3 до 18 лет:

- для лечения инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая впервые возникший (первичный) и повторяющийся (рецидивирующий) генитальный герпес;
- для профилактики рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у пациентов с нормальным иммунным статусом;
- для профилактики инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у пациентов со сниженным иммунитетом (иммунодефицитом);
- для лечения ветряной оспы и опоясывающего герпеса (раннее лечение опоясывающего герпеса ацикловиром оказывает обезболивающий эффект и может снизить частоту возникновения постгерпетической невралгии).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Способ действия препарата Ацикловир-Акрихин

Ацикловир подавляет размножение вирусов и оказывает противовирусное действие.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Ацикловир-Акрихин

Противопоказания

Не принимайте препарат Ацикловир-Акрихин:

- если у Вас аллергия на ацикловир, ганцикловир, валацикловир или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Ацикловир-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

До начала приема препарата Ацикловир-Акрихин обязательно сообщите врачу:

- если Вы беременны (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»);
- если Вы кормите грудью (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»);
- если Вы старше 65 лет;
- если у Вас нарушена работа почек (почечная недостаточность);
- если у Вас обезвоживание (дегидратация);
- если Вы принимаете другие препараты, способные оказывать негативное воздействие на почки (нефротоксические лекарственные препараты);
- если у Вас сниженный иммунитет (иммунодефицит).

Способность ацикловира снижать риск заболевания ветряной оспой у пациентов с нормальным иммунитетом не установлена.

Во время приема препарата Ацикловир-Акрихин важно пить много воды.

Если у Вас нарушена функция почек и/или Вы старше 65 лет, лечащий врач может снизить Вам дозу препарата Ацикловир-Акрихин.

Передача инфекции

Чтобы не заразить других людей, прекратите или сократите близкие контакты с другими людьми, пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены, отдельной посудой и личным полотенцем. Следуйте этим рекомендациям, даже если врач сообщил, что у Вас заболевание протекает бессимптомно.

Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Дети

Не давайте препарат Ацикловир-Акрихин детям в возрасте от 0 до 3 лет в связи с невозможностью обеспечить режим дозирования.

Другие препараты и препарат Ацикловир-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

В частности, сообщите своему врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих лекарственных препаратов:

− теофиллин (препарат для лечения бронхиальной астмы), возможно, врач назначит Вам анализы на определение содержания теофиллина в крови;

− пробенецид (препарат для лечения подагры);

− циметидин (препарат для лечения язвы желудка);

− микофенолата мофетил (препарат, предотвращающий отторжение пересаженных органов).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Врач оценит пользу для Вас и риск для ребенка при применении препарата Ацикловир-Акрихин во время беременности.

Ацикловир проникает в грудное молоко. Если Вы кормите грудью или собираетесь кормить грудью, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед началом приема препарата Ацикловир-Акрихин.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследований влияния ацикловира на способность к управлению транспортными средствами или механизмами не проводилось. Спрогнозировать негативное воздействие ацикловира на эти виды деятельности на основании фармакологических свойств действующего вещества не представляется возможным, но необходимо учитывать профиль побочных эффектов ацикловира.

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит 25 мг натрия (основной компонент пищевой/столовой соли) в минимальной суточной дозе (400 мг). Это эквивалентно 1,25 % от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей.

3. Прием препарата Ацикловир-Акрихин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Лечащий врач определит правильную дозу, частоту приема и продолжительность лечения.

Прием препарата Ацикловир-Акрихин следует начинать как можно скорее после появления первых симптомов заболевания (жжение, покраснение, зуд, появление пузырьков, боль и т. д.).

Рекомендуемая доза:

Лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая генитальный герпес

По 200 мг 5 раз в сутки (каждые 4 часа, за исключением периода ночного сна) в течение 5 дней.

Доза препарата и продолжительность приема могут быть увеличены по назначению лечащего врача.

Профилактика рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у пациентов с нормальным иммунитетом

По 200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Врач может назначить Вам иной режим дозирования: по 400 мг 2 раза в сутки (каждые 12 часов), по 200 мг 3 раза в сутки (каждые 8 часов) или по 200 мг 2 раза в сутки (каждые 12 часов).

Вы должны принимать препарат Ацикловир-Акрихин до тех пор, пока Ваш врач не скажет Вам прекратить прием.

Профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у пациентов со сниженным иммунитетом

По 200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов). Доза препарата может быть увеличена по назначению лечащего врача.

Вы должны принимать препарат Ацикловир-Акрихин до тех пор, пока Ваш врач не скажет Вам прекратить прием.

Лечение ветряной оспы и опоясывающего герпеса

По 800 мг 5 раз в сутки (каждые 4 часа, за исключением периода ночного сна) в течение 7 дней.

Ваш врач может скорректировать дозу препарата Ацикловир-Акрихин, если:

- препарат предназначен для ребенка;
- Вы старше 65 лет;
- у Вас проблемы с почками.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать препарат.

Применение у детей и подростков

Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса; профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у пациентов со сниженным иммунитетом (иммунодефицитом)

Режим дозирования для детей в возрасте от 3 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Лечение ветряной оспы

Дети в возрасте от 3 до 6 лет – 400 мг 4 раза в сутки.

Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет – 800 мг 4 раза в сутки.

Врач определит более точную дозу для ребенка исходя из его веса (но доза не должна превышать 800 мг 4 раза в сутки).

Курс лечения составляет 5 дней.

Путь и (или) способ введения

Принимать внутрь.

Препарат Ацикловир-Акрихин можно принимать во время еды. Таблетки следует запивать полным стаканом воды.

Во время лечения препаратом Ацикловир-Акрихин Вы должны пить достаточное количество воды. Это особенно важно для людей пожилого возраста или с нарушенной работой почек.

Линия разлома (риска) предназначена исключительно для разламывания таблетки с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Следует разламывать таблетку на равные половины исключительно по риске, над листком бумаги и сразу принять обе половины поочередно. Если при разламывании таблетки остались крошки или частицы, их следует также принять.

Если Вы приняли препарата Ацикловир-Акрихин больше, чем следовало

В случае передозировки у Вас могут появиться следующие симптомы: тошнота, рвота, головная боль, спутанность сознания, иногда – судорожные припадки и кома.

В случае передозировки обратитесь за медицинской помощью. Если есть возможность, возьмите с собой упаковку, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли. Врач назначит Вам лечение для устранения симптомов передозировки.

Если Вы забыли принять препарат Ацикловир-Акрихин

Если Вы забыли принять препарат Ацикловир-Акрихин, примите его, как только вспомните, и продолжайте принимать согласно рекомендациям врача. Однако, если почти подошло время для приема следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если Вы прекратили прием препарата Ацикловир-Акрихин

Всегда заканчивайте курс лечения, назначенный врачом.

Не прекращайте лечение раньше срока, даже если Ваше состояние заметно улучшилось.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Ацикловир-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Ацикловир-Акрихин и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного из следующих признаков нежелательных реакций:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- отек лица (губ, век, щек) и слизистой оболочки рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- потеря сознания (кома);
- тяжелые кожные реакции, сопровождающиеся высокой температурой тела, болью и отеком кожи и слизистых оболочек, сильным зудом, распространенной сыпью на коже и слизистых оболочках в виде пятен, пузырей, мокнущих эрозий, корок, отслойкой участков кожи, кровотечением из губ, глаз, рта, носа (токсический эпидермальный некролиз);
- воспалением на коже с сыпью в виде кругов (мультиформная экссудативная эритема);
- внезапное появление множества мелких гнойничков на покрасневшей и отёчной коже, возможно с повышением температуры тела, общим недомоганием и слабостью (острый генерализованный экзантематозный пустулёз);
- повышение температуры тела, кожная сыпь, отёк лица, увеличение лимфатических узлов; возможно поражение внутренних органов (например, печени или почек) (лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами, DRESS-синдром);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- уменьшение или отсутствие мочи, отеки, снижение или отсутствие аппетита, тошнота, рвота, вздутие кишечника, слабость, заторможенность (острая почечная недостаточность).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Ацикловир-Акрихин

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- боль в животе;
- зуд;
- сыпь, в том числе возникающая после воздействия солнца (фотосенсибилизация);
- утомляемость;
- повышение температуры тела (лихорадка).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- крапивница;
- быстрая равномерная потеря волос по всей поверхности головы (быстрое диффузное выпадение волос).

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- затрудненное дыхание (одышка);
- обратимое повышение показателей биохимического анализа крови, отражающих состояние печени (обратимое повышение концентрации билирубина и «печеночных» ферментов в крови);
- повышение показателей биохимического анализа крови, отражающих работу почек (повышение концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- снижение количества эритроцитов в крови (анемия);
- снижение количества лейкоцитов в крови (лейкопения);
- снижение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- возбуждение;
- спутанность сознания;
- тремор;
- шаткость при ходьбе и нарушение координации (атаксия);
- нарушения речи (дизартрия);
- галлюцинации;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- психотические симптомы;
- судороги;
- сонливость;
- нарушение работы головного мозга, которое может проявляться отсутствием ясности мышления, нарушением способности ориентироваться во времени и пространстве, нарушениями речи и поведения (энцефалопатия);
- воспаление печени (гепатит);
- желтуха;
- сильная боль в области поясницы, вызванная внезапным нарушением оттока мочи из почки (почечная колика).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Ацикловир-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит

Действующим веществом является ацикловир.

Ацикловир-Акрихин, 200 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 200 мг ацикловира.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Ацикловир-Акрихин, 400 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 400 мг ацикловира.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), повидон (тип К25), магния стеарат, индигокармин, карбоксиметилкрахмал натрия, вода очищенная.

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит натрий (см. раздел 2.).

Внешний вид Ацикловир-Акрихин и содержимое упаковки

Таблетки.

Таблетки голубого цвета с темно- и светло-голубыми вкраплениями и возможными белыми пятнами, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

2, 3, 4, 5 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация,

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»),

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация,

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»),

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация,

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»),

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2025 № 32500
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

(экспертной организации) http://www.grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).