ЛП-№(006670)-(РГ-RU) от 13.07.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Метопролол ретард-Акрихин, 25 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Метопролол ретард-Акрихин, 50 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Метопролол ретард-Акрихин, 100 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: метопролол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Метопролол ретард-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Метопролол ретард-Акрихин.

3. Прием препарата Метопролол ретард-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Метопролол ретард-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Метопролол ретард-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Метопролол ретард-Акрихин содержит действующее вещество метопролол, относящееся к группе: бета-адреноблокаторы; селективные бета-адреноблокаторы.

Показания к применению

Препарат Метопролол ретард-Акрихин показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет при следующих состояниях:

- Повышенное артериальное давление (артериальная гипертензия).
- Определенный тип ишемической болезни сердца (стенокардия).
- Стабильная симптоматическая хроническая сердечная недостаточность с нарушением систолической функции левого желудочка (в качестве вспомогательной терапии к основному лечению хронической сердечной недостаточности).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- Снижение смертности и частоты повторного инфаркта после острой фазы инфаркта миокарда.
- Определенные типы нарушений сердечного ритма (аритмии), включая наджелудочковую тахикардию, снижение частоты сокращений желудочков при фибрилляции предсердий и желудочковые экстрасистолы.
- Определенные типы учащенного сердцебиения (функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахикардией).
- Предотвращение приступов определенного типа головной боли (мигрени).

Способ действия препарата Метопролол ретард-Акрихин

Препарат Метопролол ретард-Акрихин защищает сердце от чрезмерной активности. Сердечная недостаточность возникает, когда сердечная мышца слаба и не может перекачивать достаточное количество крови для поддержания работы всего организма. В результате своего действия метопролол делает процесс перекачивания крови более эффективным, способствует снижению артериального давления и восстановлению нормального ритма сердечных сокращений.

Препарат Метопролол ретард-Акрихин представляет собой таблетки пролонгированного действия, которые постепенно высвобождают лекарственное вещество и обеспечивают равномерный эффект в течение 24 часов.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Метопролол ретард-Акрихин

Противопоказания

Не принимайте препарат Метопролол ретард-Акрихин:

- если у Вас аллергия на метопролол, другие бета-адреноблокаторы или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас отклонения параметров электрокардиограммы (ЭКГ), называемые атриовентрикулярной блокадой II и III степени или синоатриальной блокадой;
- если у Вас определенный тип аритмии, называемый синдромом слабости синусового узла;
- если у Вас снижена частота сердечных сокращений (ЧСС) до менее 50 уд/мин (выраженная брадикардия);
- если у Вас острая сердечная недостаточность или обострение/ухудшение течения (декомпенсация) сердечной недостаточности;
- если у Вас низкое артериальное давление (артериальная гипотензия – систолическое артериальное давление менее 90 мм рт. ст.);
- если у Вас острый инфаркт миокарда (частота сердечных сокращений менее 45 ударов в минуту, отклонение параметров ЭКГ, называемое «удлинением интервала PQ более 0,24 секунд», и систолическое артериальное давление менее 100 мм рт. ст.);
- если Вы кормите ребенка грудью;
- если Вы принимаете препараты, называемые ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) (препараты, применяемые для лечения депрессии и болезни Паркинсона);
- если Вы получаете лечение верапамилом (применяется при стенокардии, аритмии и при повышенном артериальном давлении);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- если у Вас определенный тип опухоли надпочечника (феохромоцитома), и Вы не принимаете препараты, называемые альфа-адреноблокаторами;
- если возраст Вашего ребенка младше 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
- если у Вас есть непереносимость некоторых сахаров (дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция);
- если у Вас тяжелая бронхиальная астма;
- если у Вас тяжелые нарушения периферического кровообращения.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Метопролол ретард-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Перед приемом препарата сообщите лечащему врачу, если у Вас имеются или когда-либо возникали следующие состояния:

- если у Вас сахарный диабет;
- если у Вас отклонение параметров ЭКГ, называемое атриовентрикулярной блокадой I степени;
- если у Вас бывает боль за грудиной в состоянии покоя (стенокардия Принцметала);
- если у Вас повышенное содержание кислот в плазме крови, называемое метаболическим ацидозом;
- если Вы страдаете бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ);
- если у Вас нарушение функции почек или тяжелое нарушение функции печени;
- если у Вас заболевание, характеризующееся слабостью и быстрой утомляемостью мышц (миастения);
- если у Вас феохромоцитома, и Вы принимаете альфа-адреноблокаторы;
- если у Вас повышенная функция щитовидной железы, называемая тиреотоксикозом;
- если Вы страдаете или ранее страдали депрессией;
- если у Вас псориаз;
- если у Вас есть заболевание периферических артерий, связанное с их сужением, называемое перемежающейся хромотой;
- если у Вас определенная проблема с кровообращением, называемая болезнью Рейно;
- если Вы беременны;
- если Вы человек пожилого возраста;
- если Вам предстоит хирургическая операция.

Дети и подростки

Не давайте препарат Метопролол ретард-Акрихин детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Другие препараты и препарат Метопролол ретард-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

- средства, снижающие запасы катехоламинов, например резерпин (применяется при повышенном артериальном давлении, психических заболеваниях), ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) (препараты, применяемые для лечения депрессии и болезни Паркинсона);
- гидроксихлорохин (применяется при лечении малярии);
- барбитураты (препараты, применяемые для лечения эпилепсии или нарушений сна);
- пароксетин, флуоксетин, сертралин (препараты, применяемые для лечения психических расстройств);
- амиодарон, а также антиаритмические препараты I класса, такие как хинидин, пропафенон, дизопирамид (препараты, применяемые при нарушениях сердечного ритма);
- дифенгидрамин (препарат, применяемый при аллергии);
- тербинафин (препарат, применяемый для лечения грибковых инфекций);
- гидралазин, клонидин (препараты, применяемые при повышенном артериальном давлении);
- целекоксиб, индометацин, диклофенак (нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), применяемые для уменьшения воспаления, боли и лихорадки);
- верапамил, дилтиазем (блокаторы «медленных» кальциевых каналов, применяемые при артериальной гипертензии, стенокардии и нарушениях сердечного ритма);
- адреналин (эпинефрин) (препарат, применяемый для экстренного лечения аллергических реакций и в качестве сосудосуживающего средства);
- фенилпропаноламин (норэфедрин) (препарат, применяемый в качестве противоотечного средства);
- рифампицин (антибактериальный препарат);
- сердечные гликозиды (препараты, применяемые при сердечной недостаточности);
- другие блокаторы бета-адренорецепторов (в том числе глазные капли);
- препараты, применяемые внутрь для контроля сахарного диабета (пероральные гипогликемические средства);
- циметидин (препарат, применяемый для уменьшения секреции соляной кислоты в желудке);
- препараты, содержащие алкалоиды спорыньи (применяются при кровотечениях в послеродовом периоде);
- инсулин (применяется при сахарном диабете);
- ксантины (обычно применяются при бронхиальной астме);
- лидокаин (применяется для обезболивания);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- миорелаксанты (применяются для расслабления мышц во время операции и для снятия боли и спазмов);
- кумарины (препараты, препятствующие образованию тромбов);
- препараты, содержащие этанол;
- если планируется применение ингаляционных препаратов для наркоза;
- если планируется проведение иммунотерапии (при аллергических заболеваниях);
- если планируется проведение рентгенологического обследования с введением контраста.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат Метопролол ретард-Акрихин не рекомендуется принимать во время беременности, поскольку он может нанести вред еще не родившемуся ребенку.

Если Вы кормите грудью, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат Метопролол ретард-Акрихин содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

3. Прием препарата Метопролол ретард-Акрихин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

<u>При артериальной гипертензии</u>

По 50–100 мг один раз в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 100 мг в сутки.

<u>При стенокардии</u>

По 100–200 мг один раз в сутки.

<u>При стабильной хронической сердечной недостаточности II функционального класса</u>

Рекомендуемая начальная доза препарата Метопролол ретард-Акрихин первые 2 недели – 25 мг один раз в сутки. Через две недели суточную дозу можно повысить до 50 мг, затем через две недели до 100 мг, еще через две недели до 200 мг.

<u>При стабильной хронической сердечной недостаточности III–IV функционального класса</u>

Рекомендуемая начальная доза первые 2 недели – 12,5 мг метопролола один раз в сутки. Для обеспечения режима дозирования метопролола по 12,5 мг Ваш врач может назначить Вам препараты в форме таблеток в дозе 12,5 мг или в форме таблеток по 25 мг с риской. Доза подбирается индивидуально. В период увеличения дозы Вы должны находиться под

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

медицинским наблюдением, так как у некоторых пациентов симптомы сердечной недостаточности могут ухудшиться.

Через 1–2 недели доза может быть увеличена до 25 мг препарата Метопролол ретард-Акрихин один раз в сутки. Затем, по прошествии 2 недель, доза может быть увеличена до 50 мг один раз в сутки.

При хорошей переносимости доза может удваиваться каждые 2 недели до достижения максимальной дозы 200 мг препарата Метопролол ретард-Акрихин один раз в сутки.

В случае артериальной гипотензии и/или брадикардии может понадобиться уменьшение сопутствующей терапии или снижение дозы препарата Метопролол ретард-Акрихин.

Поддерживающее лечение после инфаркта миокарда

По 200 мг один раз в сутки.

При нарушениях сердечного ритма

По 100–200 мг один раз в сутки.

При функциональных нарушениях сердечной деятельности, сопровождающихся тахикардией

По 100 мг один раз в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 200 мг в сутки.

Для предотвращения приступов мигрени

По 100–200 мг один раз в сутки.

Путь и (или) способ введения

Внутрь.

Препарат Метопролол ретард-Акрихин предназначен для приема один раз в сутки. Рекомендуется принимать препарат утром, не разжевывая, запивая водой. Таблетку препарата Метопролол ретард-Акрихин можно принимать независимо от приема пищи.

Если Вы приняли препарата Метопролол ретард-Акрихин больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Метопролол ретард-Акрихин больше, чем следовало, Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

У Вас могут появиться следующие симптомы: выраженное уменьшение частоты сердечных сокращений (брадикардия), нарушение работы сердца (вплоть до остановки сердца), выраженное снижение артериального давления, нарушение кровообращения, усиление симптомов сердечной недостаточности, тяжелая сердечно-сосудистая патология, характеризующаяся очень низким артериальным давлением (кардиогенный шок); угнетение дыхания, нарушение дыхания, синюшная окраска кожи (цианоз), повышенная утомляемость, головокружение, потеря сознания, кома, непроизвольные ритмичные колебательные движения (тремор), судороги, повышенное потоотделение, расстройство чувствительности, которое проявляется в виде покалывания, жжения, онемения или чувства ползания мурашек по коже (парестезии); спазм бронхов (бронхоспазм), тошнота, рвота, спазм пищевода, сопровождающийся болью в животе (эзофагеальный спазм); пониженное или повышенное содержание глюкозы в крови, повышение уровня калия в крови, временная слабость мышц и необычная мышечная утомляемость (преходящая миастения).

Первые признаки передозировки могут наблюдаться через 20 минут – 2 часа после приема препарата.

Если препарат принят недавно, можно провести промывание желудка и принять адсорбирующие средства.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Если Вы прекратили прием препарата Метопролол ретард-Акрихин

Не прекращайте лечение препаратом Метопролол ретард-Акрихин, не посоветовавшись с лечащим врачом.

Резкая отмена бета-адреноблокатора может привести к утяжелению течения хронической сердечной недостаточности и повышению риска инфаркта миокарда и внезапной смерти.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Метопролол ретард-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Метопролол ретард-Акрихин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения признаков серьезных нежелательных реакций, которые наблюдались нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- у пациентов с острым инфарктом миокарда может возникнуть кардиогенный шок, признаки которого включают изменение сознания, заторможенность, возбуждение, головокружение, «туман в голове», головную боль, выраженную боль за грудиной, сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, чувство нехватки воздуха, одышку;
- судороги;
- затруднение дыхания из-за сужения просвета бронхов (бронхоспазм) у пациентов с бронхиальной астмой.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Метопролол ретард-Акрихин

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- повышенная утомляемость;
- снижение скорости психических и двигательных реакций.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- снижение концентрации глюкозы в крови (гипогликемия) (у пациентов с сахарным диабетом I типа);
- снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия);
- резкое снижение артериального давления, например при вставании (ортостатическая гипотензия) (в том числе с обмороком);
- похолодание конечностей;
- ощущение сердцебиения;
- головокружение;
- головная боль;
- одышка;
- тошнота;
- боли в животе;
- жидкий стул (диарея);
- запор.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- увеличение массы тела;
- временное усиление симптомов сердечной недостаточности;
- прерывание проведения импульса от предсердий к желудочкам (атриовентрикулярная блокада I степени);
- расстройство чувствительности, характеризующееся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания, мурашек (парестезия);
- депрессия;
- снижение концентрации внимания;
- сонливость или бессонница;
- «кошмарные» сновидения;
- рвота;
- кожная сыпь (крапивница);
- усиление потоотделения.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- повышение концентрации глюкозы в крови (гипергликемия) (у пациентов с сахарным диабетом II типа);
- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоидное состояние);
- другие нарушения проводимости сердца;
- нарушения ритма сердца (аритмии);
- состояние, характеризующееся чувством слабости (астения);
- непроизвольные ритмичные колебательные движения (тремор);
- повышенная нервная возбудимость;
- тревога;
- воспаление слизистой оболочки носа (ринит);
- сухость слизистой оболочки полости рта;
- нарушения функции печени;
- гепатит;
- выпадение волос (алопеция);
- импотенция/сексуальная дисфункция;
- нарушения зрения;
- сухость и/или раздражение глаз;
- конъюнктивит.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- снижение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- гангрена у пациентов с предшествующими тяжелыми нарушениями периферического кровообращения;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- нарушение памяти/амнезия;
- подавленность;
- галлюцинации;
- слабость мышц и необычная мышечная утомляемость (миастения);
- нарушения вкусовых ощущений;
- звон в ушах;
- повышенная чувствительность к солнечному излучению (фотосенсибилизация);
- обострение течения псориаза;
- псориазоподобные кожные реакции;
- боль в суставах (артралгия);
- снижение количества клеток, называемых тромбоцитами, в крови (тромбоцитопения) (необычные кровотечения и кровоизлияния);
- снижение в общем анализе крови количества клеток, называемых гранулоцитами (агранулоцитоз), лейкоцитами (лейкопения);
- повышение активности «печеночных» ферментов;
- повышение в крови концентрации билирубина (гипербилирубинемия).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Метопролол ретард-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Метопролол ретард-Акрихин содержит

Действующим веществом является метопролол.

Метопролол ретард-Акрихин, 25 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 23,83 мг метопролола сукцината, что эквивалентно 25 мг метопролола тартрата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются:

Вспомогательные вещества: гипромеллоза (тип 2910), гипромеллоза (тип 2208), лактозы моногидрат, повидон К30, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Состав пленочной оболочки: поливиниловый спирт, тальк, макрогол 4000, титана диоксид, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид черный или готовая пленочная оболочка оранжевого цвета [поливиниловый спирт, тальк, макрогол 4000, титана диоксид, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид черный].

Метопролол ретард-Акрихин, 50 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 47,66 мг метопролола сукцината, что эквивалентно 50 мг метопролола тартрата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются:

Вспомогательные вещества: гипромеллоза (тип 2910), гипромеллоза (тип 2208), лактозы моногидрат, повидон К30, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Состав пленочной оболочки: поливиниловый спирт, тальк, макрогол 4000, титана диоксид, краситель железа оксид черный, краситель хинолиновый желтый (алюминиевый лак), индигокармин (алюминиевый лак) или готовая пленочная оболочка зеленого цвета [поливиниловый спирт, тальк, макрогол 4000, титана диоксид, краситель хинолиновый желтый (алюминиевый лак), краситель железа оксид черный, индигокармин (алюминиевый лак)].

Метопролол ретард-Акрихин, 100 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 95,32 мг метопролола сукцината, что эквивалентно 100 мг метопролола тартрата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются:

Вспомогательные вещества: гипромеллоза (тип 2910), гипромеллоза (тип 2208), лактозы моногидрат, повидон К30, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Состав пленочной оболочки: поливиниловый спирт, тальк, макрогол 4000, титана диоксид, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид черный или готовая пленочная оболочка оранжевого цвета [поливиниловый спирт, тальк, макрогол 4000, титана диоксид, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид черный].

Внешний вид препарата Метопролол ретард-Акрихин и содержимое упаковки

Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой.

Метопролол ретард-Акрихин, 25 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, желтовато-коричневатого цвета. На изломе таблетка белого с сероватым или кремоватым оттенком цвета.

Метопролол ретард-Акрихин, 50 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, от светло-зеленого до зеленого цвета. На изломе таблетка белого с сероватым или кремоватым оттенком цвета.

Метопролол ретард-Акрихин, 100 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, желтовато-коричневатого цвета. На изломе таблетка белого с сероватым или кремоватым оттенком цвета.

Упаковка

Метопролол ретард-Акрихин, 25 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Метопролол ретард-Акрихин, 50 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Метопролол ретард-Акрихин, 100 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

По 30 таблеток во флакон для лекарственных средств из полиэтилена низкого давления, укупоренный крышкой навинчиваемой или с контролем первого вскрытия, или со встроенным влагопоглотителем.

На флакон наклеивают этикетку.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»),

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12849
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»),

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.