

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Гиоксизон-Акрихин****Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Гиоксизон-Акрихин**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Гидрокортизон + Окситетрациклин

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения**Состав**

100 г мази содержат:

*действующие вещества:* гидрокортизона ацетат в пересчете на 100 % вещество – 1 г, окситетрациклина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество – 3 г;*вспомогательные вещества:* метилпарагидроксибензоат, парафин жидкий (вазелиновое масло), вазелин.**Описание**

Мазь желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** кортикостероиды, применяемые в дерматологии; кортикостероиды в комбинации с антибиотиками; кортикостероиды с низкой активностью в комбинации с антибиотиками.**Код АТХ:** D07CA01**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для наружного применения.

Гидрокортизон – глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительный, противоаллергический, антиэкссудативный и противозудный эффекты. Тормозит фагоцитоз. Уменьшает образование арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточных оболочек за счет угнетения активности фосфолипазы А<sub>2</sub>. Угнетает высвобождение интерлейкинов и других цитокинов, обладающих противовоспалительным действием; тормозит освобождение гистамина и возникновение местных аллергических реакций. Снижает синтез белков и отложение коллагена в коже, препятствует развитию соединительной ткани, ослабляет пролиферативные процессы.

Окситетрациклин – антибиотик из группы тетрациклинов, оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, *Rickettsia spp.*, *Treponema spp.*, *Chlamydia spp.*, *Mycoplasma spp.*

**Фармакокинетика**

При наружном применении препарата в терапевтических дозах трансдермальное всасывание действующих веществ в кровь очень незначительное. Применение

окклюзионных повязок повышает трансдермальное всасывание гидрокортизона и окситетрациклина, что может приводить к увеличению риска развития системных побочных эффектов.

### **Показания к применению**

Заболевания кожи, поддающиеся терапии глюкокортикостероидами и осложненные вторичной бактериальной инфекцией, вызванной чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами: дерматит (в том числе аллергический, контактный, себорейный, солнечный, атопический), экзема, многоформная экссудативная эритема, поверхностные ожоги и отморожения, укусы насекомых.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к гидрокортизону, окситетрациклину или к любому из вспомогательных веществ, туберкулез кожи, опухоли кожи, предраковые заболевания кожи, дерматомироз, вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа), розацеа и периоральный дерматит, сифилитические поражения кожи, поствакцинальные кожные реакции; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 2 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности в период грудного вскармливания противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Наружно. Наносят тонким слоем 0,5-1 г 1-3 раза в сутки на пораженные участки или на стерильную марлю, которой прикрывают кожу, перевязав бинтом. Длительность лечения индивидуальна и зависит от степени поражения и локализации.

Курс лечения не должен превышать 14 дней. При применении на коже лица мазь наносится 1 раз в сутки тонким слоем или точечно на элементы, избегая нанесения на периорбитальную область, при этом курс лечения не должен превышать 7-10 дней.

У детей старше 2-х лет применяют на ограниченных участках кожи коротким курсом (в течение 5-7 дней).

### **Побочное действие**

Раздражение кожи, зуд, сыпь; суперинфекция, аллергические реакции. При применении на коже лица: телеангиэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта. При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности – системные побочные эффекты глюкокортикостероидов.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

*Симптомы:* при длительном применении и/или в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой недостаточности и симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко-Кушинга.

Длительное лечение окситетрациклином в повышенных дозах может привести к росту нечувствительной микрофлоры.

*Лечение:* отмена препарата. Соответствующая симптоматическая терапия. При необходимости - коррекция электролитных нарушений.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не изучалось.

### **Особые указания**

Во время лечения глюкокортикостероидами не следует проводить вакцинацию против оспы и планировать другие виды иммунизации (в связи с иммунодепрессивным эффектом глюкокортикостероидов).

Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

У детей следует избегать нанесения препарата на обширные поверхности кожи и под окклюзионные повязки.

При необходимости применения препарата на коже лица лечение должно быть коротким из-за повышенного всасывания и возможности появления побочного действия.

Препарат содержит метилпарагидроксибензоат, который может вызывать аллергические реакции, в том числе отсроченные.

### **Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 1 % + 3 %.

По 10 г в тубу алюминиевую.

Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

### **Держатель регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»), Россия

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

**Производитель**

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»  
(АО «АКРИХИН»), Россия  
142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3.

**Организация, принимающая претензии потребителей**

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»  
(АО «АКРИХИН»), Россия  
142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.  
Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03.