ЛП-№(003568)-(РГ-RU) от 24.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11712
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Синафлан-Акрихин, 0,025 %, мазь для наружного применения

Действующее вещество: флуоцинолона ацетонид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Синафлан-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Синафлан-Акрихин.

3. Применение препарата Синафлан-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Синафлан-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Синафлан-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Синафлан-Акрихин содержит действующее вещество флуоцинолона ацетонид, относящееся к группе: кортикостероиды, применяемые в дерматологии; кортикостероиды; кортикостероиды с высокой активностью (группа III).

Обладает противовоспалительным, противоаллергическим и антиэкссудативным (уменьшение выделения жидкости из сосудов на поверхность ткани) действием.

Показания к применению

Препарат Синафлан-Акрихин применяется у взрослых и детей в возрасте от 2 до 18 лет при острых и хронических воспалительных и аллергических заболеваниях кожи немикробной этиологии, сопровождающихся сухостью кожи: себорейном дерматите, экземе различного генеза и локализации, атопическом дерматите, кожном зуде, псориазе, солнечных ожогах, укусах насекомых.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11712
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

2. О чем следует знать перед применением препарата Синафлан-Акрихин

Противопоказания

Не применяйте препарат Синафлан-Акрихин:

- если у Вас аллергия на флуоцинолона ацетонид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас розовые угри;
- если у Вас воспалительное заболевание сальных желез кожи (акне);
- если у Вас хроническое поражение кожи в виде пятнистых высыпаний вокруг рта (периоральный дерматит);
- если у Вас инфекции кожи, вызванные бактериями, вирусами, грибами;
- если у Вас сифилис;
- если у Вас туберкулез кожи;
- если у Вас поствакцинальные реакции;
- если у Вас трофические язвы голени;
- если у Вас зуд в области заднего прохода (аногенитальный зуд);
- если у Вас рак кожи;
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Синафлан-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

До назначения Вам препарата Синафлан-Акрихин обязательно сообщите врачу:

- если у Вас истончение кожи (атрофия);
- если Вы старше 65 лет.

Это важно для того, чтобы врач в полной мере смог оценить, насколько безопасно Вам использовать данный препарат и потребуется ли соблюдение особых мер предосторожности.

Применяйте мазь Синафлан-Акрихин короткими курсами на небольших участках кожи.

Избегайте попадания мази в глаза.

Во время лечения рекомендуется носить свободную одежду.

Если у Вас есть обыкновенные или розовые угри, на фоне терапии препаратом возможно обострение заболевания.

Если Вы отмечаете признаки повышенной чувствительности или раздражения кожи, связанные с применением препарата, прекратите лечение и обратитесь к врачу.

Продолжительное применение препарата, нанесение препарата на обширные поверхности кожи, использование закрывающих (окклюзионных) повязок, а также применение препарата у детей может приводить к увеличению всасывания препарата с поверхности кожи и повышению риска развития нежелательных реакций. В данных ситуациях необходима консультация врача.

Не наносите препарат Синафлан-Акрихин на кожу лица дольше 5 дней, поскольку длительное применение препарата, как и других кортикостероидов местного действия, может вызвать атрофию кожи.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11712
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Не наносите препарат на слизистые оболочки, раны.

При длительной терапии глюкокортикостероидами внезапное прекращение лечения может привести к развитию «синдрома рикошета», проявляющегося как воспаление кожи (дерматита) с интенсивным покраснением кожи и ощущением жжения. Поэтому после длительного лечения отмену препарата следует проводить постепенно, например, переходя на схему применения через день перед полным прекращением его применения.

Дети

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 2 лет поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Дети в возрасте от 2 до 18 лет

У детей кожные складки, пеленки, подгузники могут оказывать действие, сходное с действием окклюзионной повязки, и повышать всасывание препарата. У детей возможна большая степень всасывания препарата из-за соотношения между поверхностью кожных покровов и массой тела, а также в связи с недостаточной зрелостью кожи.

Длительное применение глюкокортикостероидов у детей может привести к нарушениям их роста и развития. Поэтому длительное применение препарата должно проводиться под контролем врача.

Применяйте у детей минимальную дозу препарата, достаточную для достижения эффекта.

У детей курс лечения не должен превышать 5 дней.

Другие препараты и препарат Синафлан-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Синафлан-Акрихин совместим с противомикробными лекарственными средствами.

Препарат снижает активность гипотензивных (снижающих уровень артериального давления), диуретических (мочегонных), антиаритмических (контролирующих нарушения сердечного ритма) лекарственных средств, препаратов калия.

Препарат Синафлан-Акрихин повышает риск развития гипокалиемии при одновременном приеме с мочегонными препаратами (кроме калийсберегающих).

Во время лечения глюкокортикостероидами не следует проводить вакцинацию и иммунизацию, в связи с иммунодепрессивным эффектом препарата.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты, перед применением препарата Синафлан-Акрихин проконсультируйтесь с врачом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не применяйте препарат Синафлан-Акрихин в период беременности и кормления грудью.

В случае необходимости применения препарата Синафлан-Акрихин при грудном вскармливании, лечащий врач может принять решение о необходимости прекратить грудное вскармливание на время применения препарата, либо разрешить использование препарата на ограниченных участках кожи.

При грудном вскармливании не применяйте препарат на коже молочных желез.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11712
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние препарата Синафлан-Акрихин на способность управлять транспортными средствами и механизмами не изучалось.

Препарат Синафлан-Акрихин содержит пропиленгликоль

Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи.

Препарат Синафлан-Акрихин содержит ланолин

Ланолин может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Синафлан-Акрихин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Препарат применяют 2–4 раза в день. Небольшое количество препарата нанесите на кожу, предварительно протертую тампоном, смоченным антисептической жидкостью, и слегка вотрите.

При ограниченных очагах поражения, для усиления эффекта, мазь можно применять под закрывающую (окклюзионную) повязку. Не применяйте под повязку более 2 г мази в сутки.

Мазь предпочтительно использовать при сухих формах дерматозов.

Применение у детей

Препарат применяют 1 раз в день. Небольшое количество мази нанесите на пораженные участки кожи, предварительно протертые тампоном, смоченным антисептической жидкостью, и слегка вотрите.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в листке-вкладыше.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, составляя обычно у взрослых 5–10 дней, при длительном течении заболевания – до 25 дней.

У детей используйте минимальные эффективные дозы, не более 5 дней.

Если Вы применили препарата Синафлан-Акрихин больше, чем следовало

Острая передозировка маловероятна. Однако, при применении препарата на больших участках пораженной кожи с повышенной способностью к всасыванию, в течение длительного времени или с использованием окклюзионной повязки возможна хроническая передозировка (применение слишком большого количества в течение длительного времени). Она сопровождается следующими признаками: повышение уровня глюкозы в крови (гипергликемия), появление глюкозы в моче (глюкозурия), а также симптомы заболевания коры надпочечников (синдром Иценко-Кушинга), которые включают лунообразное лицо, отеки и задержку жидкости.

Если Вы применили большую дозу, чем Вам было назначено, обратитесь к Вашему врачу или в местную поликлинику или больницу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11712
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Врач может назначить Вам симптоматическое лечение, а также принять решение о постепенной отмене препарата.

Если Вы забыли применить препарат Синафлан-Акрихин

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примените следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Синафлан-Акрихин:

- жжение;
- кожный зуд;
- сухость кожи;
- высыпания на коже, возникающие на фоне применения кортикостероидов («стероидные» угри);
- воспаление волосяных луковиц (фолликулит).

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при длительном применении препарата Синафлан-Акрихин:

- нарушение иммунитета, не связанное с врожденной патологией (вторичный иммунодефицит);
- избыточный рост волос (гипертрихоз);
- облысения (алопеция), особенно у женщин;
- истончение (атрофия) кожи;
- активный рост нежелательных волос на лице и теле у женщин в месте нанесения препарата (гирсутизм в месте нанесения препарата);
- сосудистые звездочки (телеангиэктазии);
- мелкопятнистые кровоизлияния в кожу (пурпура);
- нарушение пигментации.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при нанесении препарата Синафлан-Акрихин на обширные поверхности (системные проявления):

- воспаление желудка (гастрит);
- «стероидная» язва желудка;
- сниженная выработка гормонов надпочечников (надпочечниковая недостаточность);
- появление таких симптомов, как увеличение массы тела, «лунообразное» лицо/округление лица, ожирение, истончение кожи, появление морщин, сухость кожи, изменения цвета кожи, усиление роста волос на теле, выпадение волос/отсутствие роста волос/волосы, имеющие поврежденный вид (синдром Иценко-Кушинга);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11712
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

- значительное увеличение уровня глюкозы в крови на фоне применения глюкокортикостероидов («стероидный» сахарный диабет);
- растяжки (стрии);
- замедление заживления ран.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Синафлан-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Синафлан-Акрихин содержит

Действующим веществом является флуоцинолона ацетонид

Каждые 100 г мази для наружного применения содержат 0,025 г флуоцинолона ацетонида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: пропиленгликоль, вазелин, ланолин, парафин твердый.

Препарат Синафлан-Акрихин содержит пропиленгликоль (см. раздел 2).

Препарат Синафлан-Акрихин содержит ланолин (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Синафлан-Акрихин и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Мазь от светло-желтого до желтого цвета.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11712
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

По 10 или 15 г в тубу алюминиевую с бушоном из полимерных материалов. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.