ЛП-№(004006)-(РГ-RU) от 15.09.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2026 № 17636
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Клотримазол-Акрихин, 1 %, мазь для наружного применения

Действующее вещество: клотримазол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол-Акрихин.

3. Применение препарата Клотримазол-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Клотримазол-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит действующее вещество клотримазол, относящееся к группе «противогрибковые средства, применяемые в дерматологии; противогрибковые средства для наружного применения; производные имидазола и триазола».

Препарат обладает противогрибковым действием, проявляющимся в замедлении роста и гибели грибов – возбудителей заболевания (дерматофитов, дрожжеподобных и плесневых грибов). Клотримазол эффективен в отношении возбудителя разноцветного лишая. Помимо противогрибкового действия, клотримазол оказывает противомикробное действие в отношении бактерий. Клотримазол не оказывает влияние на лактобациллы.

Показания к применению

- Дерматомикозы, вызванные плесневыми и другими чувствительными к клотримазолу грибами (например, *Trichophyton*);
- дерматомикозы, вызванные дрожжевыми грибами (род *Candida*);
- заболевания кожи с вторичным инфицированием чувствительными к клотримазолу грибами;
- опрелость, вызванная грибами рода *Candida*;
- вульвит, баланит;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2026 № 17636
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

- разноцветный лишай.

Способ действия препарата Клотримазол-Акрихин

Клотримазол снижает синтез компонентов клеточной мембраны грибов и изменяет ее структуру и свойства. В больших концентрациях клотримазол взаимодействует с некоторыми ферментами клеток грибов, в результате чего в них происходит увеличение концентрации перекиси водорода до уровня, способствующего их разрушению.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол-Акрихин

Противопоказания

Не применяйте препарат Клотримазол-Акрихин, если у Вас аллергия на клотримазол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Клотримазол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При применении препарата Вам следует избегать его попадания в глаза. Не глотать.

Все пораженные грибком участки кожи следует лечить одновременно.

При появлении симптомов повышенной чувствительности или раздражения Вам следует прекратить лечение.

Сообщите своему врачу, если Вы используете в качестве контрацептивов изделия, содержащие латекс. При совместном применении с клотримазолом они могут повреждаться. Вам следует применять альтернативные методы контрацепции в течение как минимум 5 дней после применения клотримазола.

Дети

Применять препарат Клотримазол-Акрихин у детей можно только по согласованию с врачом.

Другие препараты и препарат Клотримазол-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты. Данные по взаимодействию с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Клотримазол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Данные о применении препарата у беременных женщин ограничены.

При наружном применении клотримазола негативное воздействие на репродуктивную систему не ожидается. Возможно применение клотримазола при беременности под наблюдением врача.

Период грудного вскармливания

Данные о применении препарата у кормящих женщин ограничены. Риск для ребенка полностью не исключен. Вопрос о возможности применения препарата в период грудного вскармливания должен решаться индивидуально после консультации врача.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2026 № 17636
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит пропиленгликоль

Данный лекарственный препарат содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи.

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит метилпарагидроксибензоат (нипагин)

Данный лекарственный препарат содержит метилпарагидроксибензоат (нипагин), который может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит натрия бензоат

Данный лекарственный препарат содержит натрия бензоат, который может вызывать местное раздражение.

3. Применение препарата Клотримазол-Акрихин

Всегда применяйте препарат Клотримазол-Акрихин в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Не используйте большую дозу и не используйте лекарственный препарат чаще или дольше, чем Вам назначил лечащий врач.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Рекомендуемая доза

Мазь следует наносить на пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки.

Для предотвращения рецидивов лечение следует продолжать, по крайней мере, в течение двух недель после исчезновения всех симптомов инфекции.

Путь и (или) способ введения

Для наружного применения.

Мазь следует наносить на чистые сухие участки пораженной кожи (вымытой мылом с нейтральным значением pH [около 7]). При нанесении на стопы следует их тщательно вымыть, высушить и затем наносить мазь между пальцами.

Продолжительность терапии

- инфекции, вызываемые дерматофитами – не менее одного месяца;
- инфекции, вызываемые грибами рода *Candida* – не менее двух недель.

Если Вы применили препарата Клотримазол-Акрихин больше, чем следовало

При наружном применении препарата передозировка маловероятна.

Если Вы забыли применить препарат Клотримазол-Акрихин

Вы должны использовать лекарственный препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, или как указано в листке-вкладыше, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Если Вы забыли нанести мазь, нанесите ее в то время, когда должна быть нанесена следующая доза, но не увеличивайте ее в два раза, чтобы компенсировать пропущенное нанесение мази.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2026 № 17636
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Если у Вас есть вопросы по применению лекарственного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы прекратили применение препарата Клотримазол-Акрихин

Не прекращайте лечение, назначенное лечащим врачом.

Важно завершить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите принимать препарат слишком рано, инфекционное заболевание может быть не полностью вылечено и его симптомы могут вернуться или ухудшиться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Клотримазол-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Клотримазол-Акрихин

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- аллергическая реакция, проявляющаяся сыпью, напоминающей ожог крапивой (крапивница), одышкой, снижением артериального давления, обмороком;
- сыпь на коже;
- зуд кожи;
- волдыри;
- шелушение кожи;
- боль/дискомфорт кожи;
- отек, жжение кожи;
- раздражение на коже;
- покраснение кожи (эритема);
- покалывание кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2026 № 17636
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

5. Хранение препарата Клотримазол-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 15 °С. Допускается краткосрочное хранение препарата при температуре не выше 25 ºС в течение 2-х суток.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит

Действующим веществом является клотримазол.

Каждые 100 г мази содержат 1 г клотримазола.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат (нипагин), янтарная кислота, натрия бензоат, воск эмульсионный, клещевины обыкновенной семян масло, метилцеллюлоза, моноглицериды дистиллированные, вода очищенная.

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат (нипагин), натрия бензоат (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Клотримазол-Акрихин и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Однородная мазь белого или почти белого цвета со слабым специфическим запахом.

По 20 или 30 г в тубу алюминиевую с бушоном из полимерных материалов (полиэтилен или полипропилен).

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29
Телефон: +7 (495) 702-95-03
Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2026 № 17636
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29
Телефон: +7 (495) 702-95-03
Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) http://www.grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).