

Листок-вкладыш – информация для пациента

Клотримазол-Акрихин, 1%, раствор для наружного применения

Действующее вещество: клотримазол.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол-Акрихин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол-Акрихин.
3. Применение препарата Клотримазол-Акрихин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Клотримазол-Акрихин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит действующее вещество *клотримазол*, которое относится к группе противогрибковых препаратов для местного применения. Клотримазол действует на некоторые микроскопические грибы, которые вызывают различные инфекции.

Показания к применению

Препарат Клотримазол-Акрихин применяется при следующих заболеваниях:

- грибковые заболевания кожи, кожных складок, стоп;
- отрубевидный лишай, эритразма, поверхностные кандидозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми (включая род *Candida*), плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу;
- грибковые инфекции (микозы), осложненные гнойной инфекцией кожи (вторичной пиодермией).

Способ действия препарата Клотримазол-Акрихин

Клотримазол воздействует на грибковые клетки, тормозит их размножение или уничтожает их.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол-Акрихин

Противопоказания

Не применяйте препарат Клотримазол-Акрихин (и не наносите его Вашему ребенку, если лечение требуется ему):

- если у Вас или у Вашего ребенка аллергия на клотримазол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе б листка-вкладыша);
- если Вы беременны (в I триместре беременности).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Клотримазол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Клотримазол-Акрихин следует применять только наружно. Не наносите препарат на кожу в области глаз.

Если во время лечения препаратом Клотримазол-Акрихин у Вас (или у Вашего ребенка, если лечение требуется ему) возникли какие-либо аллергические реакции (например, сильный зуд, сыпь или волдыри) или признаки раздражения (например, покраснение, зуд или отек) в месте нанесения препарата, **прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.**

Если клинические признаки инфекции сохраняются после окончания лечения, **обратитесь к врачу.**

Другие препараты и препарат Клотримазол-Акрихин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

В частности, сообщите лечащему врачу, если Вы (или Ваш ребенок, если лечение требуется ему) применяете:

- другие противогрибковые средства (амфотерицин В, нистатин, натамицин), так как при одновременном применении эффективность клотримазола может снижаться.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не принимайте препарат Клотримазол-Акрихин, если Вы беременны (в I триместре беременности). Ваш врач примет решение о необходимости применения препарата Клотримазол-Акрихин, если Вы находитесь на II и III триместре беременности.

Не наносите препарат непосредственно на молочную железу при грудном вскармливании.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Клотримазол-Акрихин при наружном применении не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Клотримазол-Акрихин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Наносите раствор тонким слоем на предварительно очищенные (с применением мыла с нейтральным значением pH) и сухие пораженные участки кожи 2 раза в день (утром и вечером) и осторожно втирайте.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Лечение следует продолжать до устранения симптомов заболевания. При грибковых заболеваниях кожи ног продолжайте лечение еще в течение не менее 2 недель после устранения симптомов заболевания.

Если Вы применили препарата Клотримазол-Акрихин больше, чем следовало

Если Вы или Ваш ребенок нанесли или случайно проглотили слишком много препарата Клотримазол-Акрихин, **обратитесь к врачу**. По возможности покажите врачу упаковку препарата Клотримазол-Акрихин.

Признаки передозировки клотримазолом в случае его непреднамеренного приема внутрь включают головокружение, тошноту и рвоту.

Если Вы забыли применить препарат Клотримазол-Акрихин

Если Вы забыли нанести препарат в обычное время, нанесите препарат, как только вспомните об этом. Не наносите двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Клотримазол-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Клотримазол-Акрихин

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- аллергические реакции: зудящие волдыри на коже (*крапивница*), отек, сыпь, покраснение кожи (*эритема*);
- местные реакции: жжение, зуд, шелушение кожи, нарушения чувствительности, проявляющиеся покалыванием или жжением (*парестезии*), раздражение в местах нанесения препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефоны: +7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30

Факс: +7 (495) 698-15-73

Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru//people>

5. Хранение препарата Клотримазол-Акрихин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на этикетке флакона и картонной пачке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит

Действующим веществом является клотримазол.

Каждый мл раствора содержит 10 мг клотримазола.

Каждый флакон объемом 15 мл содержит 150 мг клотримазола.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются изопропилмиристат, этанол 99,9 %.

Внешний вид препарата Клотримазол-Акрихин и содержимое упаковки

Препарат Клотримазол-Акрихин представляет собой раствор для наружного применения.

Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом.

По 15 мл во флаконы темного стекла, укуренные пробкой-капельницей и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полиэтилена.

1 флакон вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

Держатель регистрационного удостоверения

Польша

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски

Телефон: +48 58 5631600

Факс: +48 58 5622353

Адрес электронной почты: phv@polpharma.com

Производитель

Польша

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА»

АО Отдел Медана в Серадзе

ул. Владислава Локетка 10, 98-200 Серадз

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Россия

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03.

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org/>.