

Инструкция по применению препарата

Пантодерм®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛС-000111

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Пантодерм®

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: декспантенол

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: мазь для наружного применения

СОСТАВ

100 г мази содержат:

активное вещество: декспантенол в пересчете на 100 % вещество-5 г;

вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, миндаля масло, воск пчелиный белый, ланолин, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт 60 %, стеариновый спирт 40 %], ланолиновый спирт, вода очищенная.

ОПИСАНИЕ

Мазь от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, со специфическим запахом.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: репарации тканей стимулятор.

КОД АТХ: D03AX03.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика.

Витамин группы В – производное пантотеновой кислоты. Декспантенол переходит в организме в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.

Фармакокинетика.

При местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Концентрация ее в крови – 0,5-1 мг/л, в сыворотке крови – 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в Ко-А), выводится в неизменном виде.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сухость кожи; лечение поврежденной кожи: мелкие повреждения, ожоги (в т.ч. солнечные), ссадины, буллезный дерматит, абсцесс, фурункул, трофические язвы голени, пролежни, трещины, асептические

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Применение при беременности и в период лактации. Препарат Пантодерм® можно применять при беременности и в период лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно.

Мазь наносят на поврежденный или воспаленный участок кожи один или несколько раз в сутки.

Уход за молочными железами кормящих матерей: мазь наносят на соски после каждого кормления; можно использовать в виде компресса. Уход за грудными детьми: мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки не отмечены.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами нет.

ФОРМА ВЫПУСКА

Мазь для наружного применения 5 %.

По 30 г в тубе алюминиевой. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ

Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»,
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29
Телефон/факс: (495) 702-95-03