

Инструкция по применению препарата

Триакорт

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: P N002854/01

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Триакорт

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: триамцинолон

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: мазь для наружного применения

СОСТАВ:

100 г мази содержат: активное вещество: триамцинолона ацетонид в пересчете на 100% вещество – 0,1 г; вспомогательные вещества: глицерол (глицерин) 5 г, пропиленгликоль 8 г, диметилсульфоксид 3 г, вазелин 21 г, стеариновая кислота 3 г, воск эмульсионный 8 г, вода очищенная до 100 г.

ОПИСАНИЕ:

Мазь от белого до желтовато-белого цвета.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: глюкокортикостероид для местного применения.

КОД АТХ: D07AB09

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Фторированный глюкокортикостероидный препарат, оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое и антиэкссудативное действие. Взаимодействуя со специфическим белковым рецептором в тканях-мишенях, регулирует экспрессию кортикоидзависимых генов и влияет, таким образом, на синтез белка. Уменьшает образование, высвобождение и активность медиаторов воспаления (гистамина, кинина, простагландинов, лизосомальных ферментов). Подавляет миграцию клеток к месту воспаления; уменьшает вазодилатацию и повышенную проницаемость сосудов в очаге воспаления. Стабилизирует лизосомальные ферменты мембран лейкоцитов; подавляет синтез антител и нарушает распознавание антигена. Тормозит высвобождение интерлейкина 1, интерлейкина 2, гамма-интерферона из лимфоцитов и макрофагов. Индуцирует образование липокортина, угнетает высвобождение эозинофилами медиаторов воспаления и стабилизирует мембраны тучных клеток. Все эти эффекты участвуют в подавлении воспалительной реакции в тканях в ответ на механическое, химическое или иммунное повреждение.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Простые и аллергические дерматиты, экзема, атопический дерматит, диффузный нейродермит, псориаз, гранулема кольцевидная, красный плоский лишай, простой хронический лишай (ограниченный нейродермит), токсидермия, келоидные рубцы, гнездная алопеция, полная алопеция, укусы насекомых.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к триамцинолону и другим компонентам препарата, бактериальные, вирусные и грибковые заболевания кожи, беременность, период лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Мазь наносят равномерно тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза в день. Можно применять с окклюзионной повязкой при лихенифицированных проявлениях.

Продолжительность лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, составляя обычно 5-10 дней. При упорном течении болезни курс лечения может быть продлен до 25 дней. Не рекомендуется применение более 4 недель.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Зуд, раздражение кожи, контактная экзема, стероидные угри, пурпура.

При длительном применении – развитие вторичных инфекционных поражений и трофических изменений кожи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Глюкокортикостероидные препараты для перорального применения усиливают эффект.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не рекомендуется наносить на большие поверхности, избегать длительного применения у детей независимо от возраста.

Для профилактики местных инфекционных осложнений возможно применение в сочетании с противомикробными лекарственными средствами.

ФОРМА ВЫПУСКА

Мазь для наружного применения 0,1%.

По 10 или 25 г в тубе алюминиевой. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ

Открытое акционерное общество

«Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»,

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна,

ул. Кирова, 29. Телефон/факс: (495) 702-95-03