

Инструкция по применению препарата

Гиоксизон-Акрихин

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛС-000683

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Гиоксизон-Акрихин

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ: Гидрокортизон + Окситетрациклин

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: : мазь для наружного применения

СОСТАВ:

100 г мази содержат:

активные вещества: гидрокортизона ацетат в пересчете на 100 % вещество – 1 г, окситетрациклина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество – 3 г;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат – 0,02 г, парафин жидкий (вазелиновое масло) – 4,8 г, вазелин до 100 г.

ОПИСАНИЕ

Мазь желтого цвета.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: глюкокортикостероид для местного применения + антибиотик-тетрациклин

КОД АТХ: D07CA01

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ФАРМАКОДИНАМИКА

Комбинированный препарат для наружного применения.

Гидрокортизон – глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительный, противоаллергический, антиэкссудативный и противозудный эффекты. Тормозит фагоцитоз. Уменьшает образование арахидоновой кислоты из фосфолипидов

клеточных оболочек за счет угнетения активности фосфолипазы А2. Угнетает высвобождение интерлейкинов и других цитокинов, обладающих противовоспалительным действием; тормозит освобождение гистамина и возникновение местных аллергических реакций. Снижает синтез белков и отложение коллагена в коже, препятствует развитию соединительной ткани, ослабляет пролиферативные процессы.

Окситетрациклин – антибиотик из группы тетрациклинов, оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, *Rickettsia* spp., *Treponema* spp., *Chlamydia* spp., *Mycoplasma* spp.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При наружном применении препарата в терапевтических дозах трансдермальное всасывание действующих веществ в кровь очень незначительное. Применение окклюзионных повязок повышает трансдермальное всасывание гидрокортизона и окситетрациклина, что может приводить к увеличению риска развития системных побочных эффектов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Заболевания кожи, поддающиеся терапии глюкокортикостероидами и осложненные вторичной бактериальной инфекцией, вызванной чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами: дерматит (в том числе аллергический, контактный, себорейный, солнечный, атопический), экзема, многоформная экссудативная эритема, поверхностные ожоги и отморожения, укусы насекомых.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность, туберкулез кожи, опухоли кожи, предраковые заболевания кожи, дерматомикоз, вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа), розацеа и периоральный дерматит, сифилитические поражения кожи, поствакцинальные кожные реакции; беременность, период лактации, детский возраст до 2 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Наносят тонким слоем 0,5-1 г 1-3 раза в сутки на пораженные участки или на стерильную марлю, которой прикрывают кожу, перевязав бинтом.

Длительность лечения индивидуальна и зависит от степени поражения и локализации.

Курс лечения не должен превышать 14 дней. При применении на коже лица мазь наносится 1 раз в сутки, избегая нанесения на периорбитальную область, при этом курс лечения не должен превышать 7-10 дней.

У детей применяют на ограниченных участках кожи коротким курсом (в течение 5-7 дней).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Раздражение кожи, зуд, сыпь; суперинфекция, аллергические реакции. При применении на коже лица: телеангиэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта. При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности – системные побочные эффекты глюкокортикостероидов.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы: при длительном применении и/или в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой недостаточности и симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко-Кушинга.

Длительное лечение окситетрациклином в повышенных дозах может привести к росту нечувствительной микрофлоры.

Лечение: отмена препарата. Соответствующая симптоматическая терапия. При необходимости – коррекция электролитных нарушений.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время лечения глюкокортикостероидами не следует проводить вакцинацию против оспы и планировать другие виды иммунизации (в связи с иммуно-депрессивным эффектом глюкокортикостероидов).

Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

У детей следует избегать нанесения препарата на обширные поверхности кожи и под окклюзионные повязки. При необходимости применения препарата на коже лица, лечение должно быть коротким из-за повышенного всасывания и возможности появления побочного действия.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Не влияет.

ФОРМА ВЫПУСКА

Мазь для наружного применения 1 % + 3 %.

По 10 г в тубе алюминиевой. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

По рецепту.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03.