

Инструкция по применению препарата

Гепарин-Акрихин 1000®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛС-002316-220615

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Гепарин-Акрихин 1000®

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ: гепарин натрия

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: гель для наружного применения

СОСТАВ: 100 г геля содержат:

Активное вещество: гепарин натрия в пересчете на сухое вещество - 0,83 г (100000 ME);

Вспомогательные вещества: метилпарагид-роксibenзоат – 0,15 г, карбомер 940 – 1,25 г, триметамол – 0,85 г, этанол 96 % (спирт этиловый ректификованный) – 24 г, лаванды масло – 0,02 г, апельсина цветков масло (неролиевое масло) – 0,01 г, вода очищенная – до 100 г.

ОПИСАНИЕ: Прозрачный или почти прозрачный, бесцветный или со слегка желтоватым оттенком гель со специфическим запахом.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: антикоагулянтное средство прямого действия для местного применения

КОД АТХ: C05BA03

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ФАРМАКОДИНАМИКА

Прямой антикоагулянт, оказывает противовоспалительное, антипролиферативное, противоотечное и обезболивающее действие. Уменьшает агрегацию тромбоцитов, связывается антитромбином III, предупреждая переход протромбина в тромбин. Угнетает активность тромбина. Снижает активность гиалуронидазы, повышает фибринолитические свойства крови. Улучшает микроциркуляцию и активизирует тканевой обмен, благодаря этому ускоряет процессы рассасывания гематом и тромбов, в конечном итоге восстанавливает проходимость вен, клинически это сопровождается выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Незначительное количество гепарина абсорбируется с поверхности кожи в системный кровоток. Максимальная концентрация действующего вещества в крови отмечается через 8 часов после аппликации. Выведение гепарина, в основном, происходит через почки, период полувыведения 12 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тромбофлебит поверхностных вен; локализованные инфильтраты и отеки мягких тканей; травмы сухожилий и суставов, ушибы мягких тканей и суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, язвенно-некротические изменения кожи в местах предполагаемого нанесения геля, травматическое нарушение целостности кожных покровов, пониженная свертываемость крови, тромбоцитопения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Препарат не противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Гель наносят тонким слоем на область поражения из расчета 3 – 5 см геля на участок кожи диаметром 3 – 5 см и осторожно втирают в кожу.

Применяют 1 – 3 раза в сутки ежедневно до исчезновения воспалительных явлений, в среднем от 3 до 7 дней. Сроки лечения определяются врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Кожные аллергические реакции, гиперемия кожи.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Передозировка маловероятна в связи с низкой всасываемостью компонентов геля. Проявляется кровоточивостью. Снимается протамином сульфатом (химический антагонист).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не рекомендуется смешивать с другими средствами для наружного применения. Не назначают местно одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами, тетрациклинами, антигистаминными средствами.

Совместное применение геля с пероральными антикоагулянтами может вызвать удлинение протромбинового времени.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, слизистых оболочках и при наличии местных гнойных процессов.

Использовать с особой осторожностью при повышенной проницаемости сосудов. Применение геля не рекомендуется при глубоком венозном тромбозе.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель для наружного применения 1000 МЕ/г.

По 30 или 50 г в тубе алюминиевой. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте,

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (ОАО «АКРИХИН»), Россия.

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

22 июня 2015 г.